

本經序疏要

本經序疏要卷之二目錄

中惡十二

霍亂十三

轉筋十四

嘔哕十五

大腹水腫十六

腸澼下痢十七

大便不通十八

小便淋十九

小便利二十

溺血二十一

本經序疏要卷之二

武進鄒澍學

中惡

麝香溫。○中惡心腹暴痛脹急痞滿

雄黃平寒大溫。○中惡腹痛鬼疰

丹沙微寒。○中惡腹痛毒氣

升麻平微寒。○中惡腹痛

乾薑溫大溫。○中惡霍亂脹滿

巴豆溫生溫熟寒

當歸溫大溫。○中惡客氣虛冷

芍藥平微溫。○中惡腹痛腰痛

吳茱萸溫大熱。中惡心腹痛逆氣

鬼箭寒。中惡腹痛

桃梟微溫。中惡腹痛殺精魅

桃皮平。中惡腹痛胃中熱

桃膠微溫。中惡疰忤

唐本

烏頭溫大熱

烏雌雞血平。中惡腹痛

蜀海桐皮平。主霍亂中惡

肉豆蔻溫。主中惡冷疰嘔沫冷氣

蓬莪茂溫。主心腹痛中惡疰忤鬼氣

藥對牛黃平君。主卒中惡

芎藭溫臣。主中惡卒急腫痛

苦蕒寒君。主中惡腹痛

藥性論

梔子大寒臣。主中惡通小便

藥性論

枲耳葉微寒臣

桔梗微溫臣。主中惡

桃花平使。治惡氣

日華

巢氏云中惡者卒然心腹刺痛悶亂欲死也按此與賊風均爲卒發之病第風係陰陽之偶愆故鍾於音聲發爲飄驟由腠理入筋脈而阻人營衛此是陰陽之偏駁故鍾於臭味發爲激射由口鼻入胃腹而隔人氣血耳其已中人也又或爲嘔吐或爲腸澀下利

或爲腹脹或爲霍亂自當各按見證而求治惟或著於陰而錮陽或著於陽而逼陰或著於血而閉氣或著於氣而動血種種不同是以投其間抵其隙或崇陽以化陰或由陰以起陽或通氣以調血或和血以行氣大率用苦辛溫烈爲主治間之推蕩以開其蔽佐之升發以揚其遏率之辟惡以奪其魄維之調和以緩其急因其欲上而上之因其欲下而下之因其欲外而外之因其欲行而行之盡矣第此與心腹冷痛大同不過彼係積漸而成此由卒暴而得以冷原天地之正氣惡是天地之沴氣正氣與正氣自能彼此相容不久可化乃痛而不已焉則其人正氣之不

足尤盛故治之者多以補而溫。診氣與正氣本不能相入故隨卽激而發病而治之者必相度其勢而疏淪利導之也。奈何世之診視二者不目爲急痧卽謂爲肝氣急痧則用金石開洩之劑猶可開通閉塞。挾去穢氣肝氣則用骯髒利氣之物不能去病適以導病游行他所治病貴乎先正病名厥有旨哉。

霍亂

人薄微寒微溫。霍亂吐逆調中

朮溫。霍亂吐下不止

附子溫大熱。心腹冷痛霍亂轉筋

桂心大熱。霍亂轉筋

本經序疏要

卷二

三

乾薑溫大熱。霍亂脹滿

橘皮溫。氣衝胃中吐逆霍亂止洩

厚朴溫大溫。霍亂腹痛脹滿

香薷微溫。霍亂腹痛吐下

麝舌微溫。主霍亂腹痛吐逆心煩

高良薑大溫。胃中冷逆霍亂腹痛

木瓜溫。霍亂大吐下轉筋不止

蜀椒小蒜溫。歸脾腎主霍亂腹中不安

雞屎白微寒

菹豆葉。主霍亂吐下不止

雞舌香微溫。療霍亂心痛

豆蔻溫。山薑去惡氣溫中中惡霍亂心腹冷痛功

用如薑

楠材微溫。主霍亂吐下不止

蓬莪茂溫。主霍亂冷氣吐酸水

肉豆蔻溫。主霍亂中惡冷症嘔沫冷氣

海桐皮平。主霍亂中惡

藥對

吳茱萸大熱臣。主霍亂瀉利

日華

證類

丁香。溫脾胃止霍亂擁脹

既云嘔吐而利名霍亂矣復云病發熱頭痛身疼惡寒吐利者名霍亂是霍亂之證不特吐利必且兼有表證矣又云利止復更發熱又云卻四五日至陰經

上轉入陰必利又云似欲大便而反失氣仍不利者
陽明見霍亂之證吐利止後有表證不止者且有
實則入陽明虛則入三陰者矣傷寒論霍亂篇寥寥
數策而外自三陽內至三陰貫通周浹傳變分明治
法詳盡如此何容復贅一辭乃茲篇更以藥二十餘
味命爲通治霍亂而仲景所不用者十居其八是果
於仲景之書有關會否耶蓋嘔吐暨下利有因傷寒
而致者有不因傷寒而致者則霍亂亦必如是矣霍
亂之有因傷寒而致有不因傷寒而致於何別哉巢
氏曰霍亂者揮霍之間便致繚亂也由人溫涼不調
陰陽清濁相干亂於腸胃變發則心腹絞痛心痛者

先吐腹痛者先利心腹竝痛則吐利俱發實者身發熱頭痛體痛虛者但吐利而已其別有飲酒食肉腥膾生冷過度者有居處不節者有露臥溼地者有當風取涼風冷襲之者皆歸於三焦傳於腸胃而作也惟此則不特霍亂之或因傷寒或不因傷寒既可曉然卽此篇藥品所主亦將思過半矣蓋補虛有調中和中之物去實有利氣疏氣之物驅溼有散發滲利之物達外有開拓經絡之物以及解酒辟腥卻寒除水槩欲腸胃間陰陽相順而不相干使廩於三焦輸於膀胱是不特竟霍亂之委抑且徹霍亂之源矣於仲景書又何悖焉

轉筋

小蒜溫

木瓜溫

橘皮溫

雞舌香溫

楠材微溫○轉筋日華

豆蔻溫

香薷微溫○轉筋可煮汁頓服半升孟詵

杉木微溫

藟豆微溫

薑微溫掌氏曰本經朱字乾薑溫墨字生薑微溫若從朱字則是乾薑即不當言微溫若從微溫則是

生薑卽當作墨字然二薑俱不主轉筋難以改正

霍亂有因傷寒而致有不因傷寒而致固然矣轉筋有因霍亂而致有不因霍亂而致亦不易之理也奈何此篇所陳藥品檢覈本經別錄多無主轉筋明文率有主霍亂名目則一似轉筋竝由霍亂來者可乎蓋巢氏之言可徵矣云大吐下後陰陽俱虛血氣皆極則手足逆冷而營衛不理冷搏於筋筋遂爲之轉云足太陽下血氣皆少則喜轉筋喜踵下痛以血氣少則易虛虛而風冷乘之故也是以時俗之發轉筋止有兩端一者由霍亂一者老人夜臥足間不煖而二者之來一係吐下後一係無病又一則足筋轉手

筋亦轉一則及足不及手皎然可辨也惟篇中所列
祇及霍亂轉筋而不及老人轉筋此則應有說焉夫
曰冷搏之冷乘之是冷氣能及筋筋畏冷氣爲之絞
轉非冷能入之也而皆云因血氣之少營衛之虛則
護衛失於外蔥餒存乎中其情益著矣然其虛也有
方病方不病之殊方病者摘去其病源病已而轉筋
不能不已方不病者亦必求其所以虛之由自當覈
諸虛勞腰痛等篇若以虛勞腰痛等篇煖下補益之
物混於此中則似霍亂轉筋亦有溫補之治以霍亂
者必轉筋老人者不皆轉筋故其治自宜畧畫分明
耳霍亂篇尙兼用補益惟此篇則消暑祛溼溫中利

氣獨不及補益可見霍亂固有因虛而作者第因虛而作者多不必轉筋則此篇雖寥寥數味又豈不足取證於別錄本經豈竟遂無間隙可尋義旨可按耶
嘔哕

厚朴溫大溫○胃中冷逆胃中嘔不止

香薷微溫

麝舌微溫

雞舌香微溫

附子溫大熱

小蒜溫

楠材微溫

高良薑大溫。暴冷胃中冷逆

木瓜溫

桂大熱。欬逆結氣擁痹

附子溫。胃中瘕熱逆氣沖胃中吐逆

檳榔葉平。卒嘔不止下氣

麝香溫

肉豆蔻溫。中惡冷疰嘔沫冷氣

藥對青竹筴微寒主嘔嘔臣

蘆根寒生主嘔。開胃除噎噦不止

藥性論

通艸平主嘔臣。心煩噦出音聲

生薑莢根汁寒

證類人淺微寒微溫。胃脅逆滿

丁香溫

朮溫

說文玉篇廣韻皆無哕字哕字始於難經第十六難曰其病煩心心痛掌中熱而哕有是者心也滑氏注云哕乾嘔也夫哕之義爲乾嘔而此篇之目曰嘔哕若合爲一貫則嘔哕連稱於義不可通若分作兩層剖嘔與乾嘔爲二項則嘔又與下文嘔吐條犯複矣諸病源候論嘔之目有六曰乾嘔曰嘔噦曰噦曰嘔吐曰噫酢曰惡心是乾嘔不能與嘔同稱之證其諸爲嘔噦之譌歟廣韻噦字讀呼會切者其義爲鳥聲

於此無涉讀於月切者其義爲逆氣而凡宛傍之𦣻
苑字讀於月紆物於歇等切則𦣻𦣻以聲相近而爲
省體稔矣况本篇通草下藥對云主𦣻而別錄則謂
心煩𦣻出音聲非確不可移之證耶嘔𦣻云何巢氏
曰胃受邪氣則嘔脾受邪氣則脹而氣逆遇冷折之
氣不通則𦣻靈樞口問篇曰穀入於胃胃氣上注於
肺今有故寒氣與新穀氣俱還入胃新故相亂眞邪
相攻氣并相逆復出於胃故爲𦣻是嘔者氣上逆而
有物𦣻者氣上逆而有聲或先有聲而繼之以物或
既有物而復續之以聲者命曰嘔𦣻何爲不可乎以
是知嘔𦣻有因氣者有因寒者有因火者有因水者

有因虛者導氣更橫開直降散洩通順之不同逐寒
又溫中煖下開結通陽之各異至於益津調中以退
火開解滲利以驅水益氣洩溼以補虛篇中莫不隨
事而制宜因利而乘便要之皆直揭其原而濬其流
斯無盛盛虛虛之弊耳傷寒論云傷寒大吐大下之
極虛復極汗出者以其人外氣怫鬱復與之水以發
其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也云傷寒噦而
腹滿視其前後知何部不利利之則愈金匱要畧云
病人胃中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心中憤
憤然無奈者生薑半夏湯主之云乾嘔噦若手足厥
者橘皮湯主之噦逆者橘皮竹茹湯主之夫以水火

相軋而病以陰開陽入而愈其常也而不知縷析條分源同派異有如本篇者又焉得不揣切本篇義旨而爲仲景擴充微蘊耶

大腹水腫

大戟寒大寒。十二水腹滿急痛

甘遂寒大寒。大腹疝瘕腹滿面目浮腫

澤漆微寒。皮膚熱大腹水氣四支面目浮腫

葶藶寒大寒。邪水上出面目浮腫下膀胱水

芫花溫微溫。消胃中痰水喜唾

巴豆溫生溫熟寒。畱飲痰癖大腹水脹

豬苓平

防已平溫。水腫風腫。

澤蘭微溫。大腹水腫身面四支浮腫骨節中水。

桑根白皮寒。水腫腹滿臚脹利水道。

商陸平。水腫痿痹腹滿洪直疏五臟散水氣。

澤瀉寒。逐膀胱三焦停水。

郁李仁平。大腹水腫面目四支浮腫利小便水道。

海藻寒。腹中上下鳴十二水氣。

昆布寒。十二水腫。

苦瓠寒。大水面目四支浮腫下水令人吐。

小豆平。下水利小便。

瓜蒂寒。大水身面四支浮腫下水。

鱖魚寒。溼痺面目浮腫下大水

鯉魚寒。水腫腳滿下氣

大豆平。逐水脹除胃中熱痺

薏花寒微寒。下十二水利水道

黃牛溺寒。水腫腹脹腳滿利小便

蜀本海松子小溫。散水氣

藥對香薷微溫主水腫臣。散水腫

穀米微寒主逐水腫利小便臣

通草平主利水腫及小便臣

麥門冬微寒臣。身重目黃心下支滿

椒目寒主除風水滿使

柳花寒主腹腫使○風水黃疸面熱黑

雄黃平君

白朮溫逐風水結腫君

秦朮微溫主下大水臣

水腫一證支派甚多在素問有腎風風水湧水之別
在靈樞有膚脹鼓脹腸覃石瘕石水之別在金匱要
畧有風水皮水正水石水氣水血分氣分之別在諸
病源候論有水分毛水疸水燥水溼水水癥水瘕水
蠱水澼之別今以藥三十三物概之謂可挈其要領
而盡其變歟是固不可然其命意所在亦實有甚廣
大而極精微者不可不察也蓋水者節制於肺輸引

於脾敷布於腎通調於三焦膀胱此其分焉者也一處有病則諸處以漸窒礙乃遂成水此其合焉者也自其分者而言則或始於喘呼或始於脛腫或廓於皮膚或充於腸胃或綳急於外而中空或堅結於裏而中實自其合者而言則均之一身支體面目洪腫已矣就其合邇其分而別其勢之靜與動虛與實驗其機之上與下出與入焉以迎而奪之適事爲故非已得其要領遂貫其條目也耶或謂湯液酒醴論所謂開鬼門潔淨府者是治水之大綱詳篇中所列藥品大都皆屬潔淨府而於開鬼門僅畧及焉不可謂偏而不全乎夫論治論藥自是二端無容相混就如

金匱要畧水氣篇何嘗不麻黃桂枝細辛生薑間用其黃芪附子甘草石膏芍藥杏仁枳實用之亦不一而足又如千金方外臺秘要等以兼喉中鳴而加白前半夏兼欬上氣而加五味乾薑兼小便癰閉而加石韋兼癥瘕及澀而加麝香牽牛黎蘆苦蘘狼毒烏頭野葛雄黃兼滿而加厚朴兼結而加射干兼熱而加黃芩大黃用適其當未嘗不奏捷也而目之謂主水腫可乎蓋治必以方方必該一病之全藥須求主主必抵一病之隙歷繹自唐已前方書固有治水而不用此篇之藥者矣未有他證不兼有水而用此篇之藥者也則彼此交互之處豈無意義寓於其間乎

水證必小便不利茯苓爲利小便統領本經載之仲
景遵用之別錄且一謂其主大腹淋瀝二謂其主水
腫淋結此獨屏不載入豈無故哉夫松當生長之際
其氣上行則質疏而葉散色青而不彫及斬伐之餘
其氣下淪則疏變爲堅散變爲整故若松脂之主疽
瘡松實之主風痺松葉之主風溼松節之主久風皆
病淫於軀體而不能散者至茯苓之利水則病結於
中而不能下者觀其上行之氣於色爲青下行之氣
於色則白青主升而白主降其能利水審矣第茯苓
之利水固降水之結於中而不下者若水而過賴在
山汪洋盈溢則非其所能降也篇中諸味所主之證

不曰面目四支浮腫則曰腹滿臄脹急痛盡向上向橫之水是豈茯苓所能利故別錄所列不合之曰大腹水腫而分之曰大腹淋瀝水腫淋結夫淋者小便濇也結則閉而難通瀝則通而不爽大腹則氣盛於水水腫則水盛於氣曰大腹淋瀝見氣不能化水曰水腫淋結見水不從氣化茯苓者專行直道令水道氣通使水隨氣化而下是固的對相符之劑矣而本篇不載非漏也亦非佚也見其所主者淋而非主大腹水腫也若載之豈不嫌於能主上出橫出之水乎是故大腹水腫而淋瀝淋結用之可也不淋瀝淋結用之無益也此其不載之故歟

然則澤蔦猪苓非茯苓儔歟且其經文絕不及大腹
水腫乃得竝列篇中何也夫水不畏其難於決泄而
畏其旁溢上出不患其不從陽宣而患其不從陰化
故凡水病仲景收列之方後人獲效之法用溫用補
者何限此篇槩不及焉非匿也蓋以日暴水以火熯
水原夫人知之無煩更諄諄耳良以水體陽而用陰
性動而好靜試觀天下巨川凡歸壑處必先滙爲大
浸復束而狹之則其奔流就下自無阻滯不畏其更
淤濁而淀矣猪苓所治之水平流漶漫不攬亦濁澄
亦不清者也而欲其從陰化是猶使滙爲澤乃加束
縛焉以助其湍疾耳是本經利水道之謂也凡水中

有熱則趨下必梗以熱欲上而水欲下也其在人而應之以濁并可見其非特熱不得伸水亦不得升矣惟澤蔦善使水中之氣出於水上氣伸而水亦升水中之精微升則其體質降矣故本經稱之曰消水別錄稱之曰主消渴而更謂爲逐膀胱三焦停水也夫膀胱屬太陽三焦屬少陽少陽爲樞太陽爲開惟陽盛而不開緣樞折而不轉則其所蓄非熱其誰水以熱停而欲逐之自宜先轉其樞樞轉而升降自遂矣要而論之澤蔦所主是水中之氣不化故於大腹水腫爲要劑豬苓茯苓所主是水不從氣化故應次之而茯苓是水蓄於陰不從陽化豬苓是水漫於陽不

本草綱目卷二
從陰化以兩者相較則不從陽化者其常不從陰化者其變以是常者可畧變者不應畧耳

腸澼下利

赤石脂。腹痛洩澼下利赤白

龍骨平微寒。泄利膿血

牡蠣平微寒。澀大小腸止大小便

乾薑溫大熱。腸澼下利

黃連寒微寒。腸澼腹痛下利

黃芩平大寒。腸澼洩利逐水

當歸溫大溫。止利腹疼

藥性論

附子溫大熱。下利赤白

禹餘糧寒。○煩滿下赤白小腹痛結煩疼

藜蘆寒微寒。○洩利腸澼

槲木寒。○止洩利

雲實溫。○洩利腸澼

礬石寒。○寒熱洩利白沃

阿膠平微溫。○療風止洩

熟艾微溫。○止赤白利

陟釐大溫。○溫中消穀強胃氣止洩利

石硫黃溫大熱

蠟微溫。○下利膿血

白蠟。○久洩澼後重見白膿

烏梅平。除冷熱利。

石榴皮平。療下利。

枳實寒微寒。止利。

蜀本使君子溫。療溼利。

金櫻子平溫。療脾洩下利。

藥對白石脂平主水利臣。止腹痛下水小腸澼熱澹便

膿血

牛角鰓溫治利臣。止冷利瀉血

藥性論

滑石寒主澼下君。身熱洩澼

地榆微寒止血利

桂心大熱主下利君

吳茱萸大熱主冷下洩臣

鯽魚頭溫主下利。作鱠主久赤白利

厚朴溫主下洩腹痛臣。洩利

白朮溫主胃虛冷利君

蜜平主赤白利君。止腸澼

龜甲平主下洩臣。漏下赤白

人蜺穀寒主下利使

薤白主下赤白利臣

白頭翁溫主毒利止痛使

猬皮平主赤白利臣。腸風瀉血

蚘蛇膽寒主下蠱蟲使

柏葉微溫主血利君

蒲黃平主下血臣

小豆花平主下利使

麴溫主腹脹冷積下利臣。消穀止利

豬懸蹄微寒主下漏洩使

雞子平主下利。卵白主小兒下洩

貝子平主下血

白蘘荷微溫主赤白利臣

葛穀平主十年赤白利臣

赤羊脂溫主下血臣。合腎爲羹療勞利

唐本

菰蓉微溫主赤白下利臣。除膀胱邪氣腰痛止利

赤白花鼠尾草微寒主赤白下利使。下利膿血不

止白花者主白赤花者主赤

證類赤地利平。赤白冷熱諸利

桃花石溫。大腸中冷膿血利

腸澼下利顯不同科釋名云洩利言其出漏洩而利也下重而赤白曰膿言厲滯而難也是一病於通一病夫塞烏得以一物兩縮之耶殊不知塞與通皆由於結陰結而陽不足以破之是以病乎通陽結而陰不足以入之是以病乎塞故治利治澼不容苟同解結闢途仍歸一轍此篇中用溫劑燠寒滯泄劑逐水停所以既堪挽其過通即得開其蔽塞也而其批卻

導欬卻又別有經緯蓋讀傷寒論金匱要畧而知其
部署分析各有區域焉曰久利曰暴利而已矣治久
利者烏梅丸是也暴利者復宜分上中下三停所謂
傷寒服湯藥下利不止心下痞硬服瀉心湯已復以
他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中者理
中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復利不止
者當利其小便是也合四方一法而本篇原所載藥
已十得八九矣再覈之以熱利氣利清穀利厥逆利
既吐且利實結利此中豈復更有餘蘊哉惟一篇之
中別有所因一證之內更有罅隙故不得不窮其流
而指以歸束如病在血者及開闔之不遂者食物之

不化者徑道之枯澀者自當各有各的對之治焉其他兼外邪者解其表而利自甯因勞乏者補其虛而漏自止則又不待言而可識矣

水利久水利赤利久赤利血利久血利赤白利久赤白利瘡利久瘡利此外臺秘要方條目也熱利冷利瘡溼利此千金方條目也太陽病桂枝證醫反下之利遂不止太陽中風下利嘔逆太陽與陽明合病必自下利太陽與少陽合病下利傷寒發熱汗出不解心中痞硬嘔吐下利陽明少陽合病必下利太陰爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛自利不渴者屬太陰少陰病脈微下利少陰病下利清穀裏寒

外熱厥陰病下之利不止傷寒先厥後發熱而利者必自止見厥復利傷寒始發熱六日厥反九日而利後三日軋之其熱續在者期之旦日夜半愈此傷寒論條目也統而釋之一言新久一言冷熱一言表裏其何以合之是篇而使有所適從乎夫是篇者所以盡其常三書者所以極其變無是篇諸藥不足定下利之指歸無三書推原不足知下利之委曲此三書與是篇互相發明還相成就處也至三書旨趣似若猶有歧者然千金不云乎利方萬千撮效七八宏之在人陟釐凡烏梅凡松皮散暴利服之何有不差溫脾湯建脾凡久利得之焉能不愈而陟釐等法載在

熱利溫脾等方隸諸冷利是已可就新久而分冷熱
矣况在傷寒金匱玄機妙諦如走盤珠毫無窒礙如
植芎藭逐節生根而其歸著仍有大綱挺然對峙則
曰自利因下而利也自利者不乘裏不虛因下而利
者不連表難治何以故曰下利脈沉弦者下重也脈
大者爲未止脈微弱數者爲欲自止雖發熱不死曰
下利有微熱而渴脈弱者令自愈曰下利脈數有微
熱汗出令自愈設復緊爲未解此自利乘裏可治之
候也曰下利手足厥冷無脈灸之不還反微喘者死
曰少陰病惡寒身踈而利手足逆冷者不治此自利
乘裏不可治之候也曰太陽病下之後其氣上沖者

可與桂枝湯如前法曰太陽病下之仍頭項強痛翁
翁發熱無汗心下滿微痛小便不利桂枝去桂加茯苓
苓白朮湯主之此雖下而連表之候也曰動氣在下
不可下下之則腹脹滿卒起頭眩食則下清穀心下
痞曰咽中閉塞不可下下之則上輕下重水漿不下
臥則欲蹠身急痛下利日數十行此因下而不連表
之候也雖然利之支流庸詎止是如膿血利水飲利
寒熱錯雜利熱利協熱利甚者有應下之利且不一
端焉何也蓋病之情不一病之變不一病之遷延不
一病之駐足不一若因乎熱因乎實而止者不行行
者不止以至水不資火火不運水則捨下何以使熱

去而水得溫土水既溫土而火遂暢朗耶夫然故下證多矣多不云急下而惟下利之當下者每稱急下此可憬然悟也若夫以寒已熱以錯雜對待錯雜其理皆甚易明以驅飲除水俾水去而利自止者更不煩言矣

更有一言可明全局者曰千金方之以利屬脾藏也夫脾不爲土乎利者水土之不膠黏也素問經脈別論食氣入胃散精於肝淫氣於筋食氣入胃濁氣歸心淫精於脈脈氣流經經氣歸於肺肺朝百脈輸精於皮毛毛脈合精淫氣於府府精神明畱於四藏氣歸於權衡權衡以平氣口成寸以決死生流轉藏氣

徧沾所合而不及脾腎是可證食入於陰氣長於陽
矣飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於
肺通調水道下輸膀胱水精四布五經竝行合於四
時五藏陰陽揆度以爲常則獨重脾腎夾輔以肺與
三焦三焦肺通膀胱之道也而徧行陽道以澤陰是可明飲入

於陽氣長於陰矣故小戴禮郊特牲曰凡食養陰氣
也飲養陽氣也不可互相發明耶土之於水也能涸
而後布水之於土也就範而後流猶江河必行於地
設使地不足以隄水爲害者固水也受害者其誰耶
土卑靡則水爲窪積而至盈必潰捨培土何以使之
相和土剛磽則水不沾洩而無畱必燥捨壅土何以

使之相入大寒凝沍凌結於上土燥於下捨溫煦無從就和大暑溽潤土既饜飫水遂漫溢捨涼肅決難消落此篇中用寒用溫厚土疏土所以竝行不悖至若土之高下驟殊水之奔駛莫挽宜於置閘以蓄之水之衝激所向土之抵禦難周宜於加隄以護之此篇中用濇用固之旨更若土平水漫待涸無期何能不鑿渠以導水低土燥盼澤維艱何能不仰厚爲資此篇中用疏洩用滋柔之方也他如緣蟲聚而水礙流因食滯而水被阻血結亦能致氣濇氣濇遂足離水土之交氣漓亦能致血漓血漓儘足解鍵鏽而潰烏能不一一涉及脾腎哉

大便不通

大黃寒大寒。○蕩滌腸胃推陳致新通利水穀

巴豆溫生溫熟寒。○蕩練五藏六府開通閉塞利水穀

道

石蜜平微溫

麻子平。○初食利大小腸久食則否

陳士良

牛膽大寒。○利大小腸

藥性論

猪膽微寒

證類朴消寒大寒。○逐六府積聚結固留癖

芒消大寒。○五藏積聚久熱胃閉

大戟寒大寒。○利大小腸

檳榔溫○逐水除痰癖

牽牛子寒○治疰癖氣塊利大小便

藥性論

郁李仁平○治腸中結氣關格不通

藥性論

以大便不通而用篇中諸味皆可無藉思索立得成驗者豈遂徑情直行竟投之乎抑猶當瞻顧詳審乃用之也予則謂下藥終不可浪投觀仲景諄諄於不可下至反覆煩碎而所謂當下之急下之者脫口而出又若斷不容遲則其故必有在矣夫當下之證莫多於陽明篇以陽明之病爲胃家實正大便不通之謂也然猶汗出多者不可下小便多者不可下不能食者不可下脈緩弱者不可下何况咽中閉塞者不

可下諸外實者不可下。脈浮大者不可下。病欲吐者不可下。諸四逆厥者不可下。面合赤色者不可下。心下硬滿者不可下。又疊載於不可下篇。耶雖然既已識其不可用。卽不失其所當用。故夫大便不通而無以上諸證。旁見側出者。遂徑情直行而用之。何患焉。以是觀之。則篇中所載。已覺其謹嚴不苟甚矣。夫推寒蕩熱兩物之雄爽峻健。既已竝峙於前。餘非潤以滑之。則血肉之品。苦以洩之而已。下藥何限。豈獨此區區哉。卽唐氏所續。軟堅逐水。導氣開結。又豈無功相似性相近者。可以羅列備採耶。太陽病寸緩關浮尺弱。其人發熱汗出不惡寒而渴者。此轉屬陽明也。

小便數者大便必硬不更衣十日無所苦也渴欲得
水少少與之但以法救之渴者宜五苓散傷寒五六
日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便硬
脈細者此爲陽微結必有表復有裏也可與小茈胡
湯陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尙微煩不
了者此大便必硬故也以亡津液胃中乾燥故令
大便硬當問其小便日幾行若本小便日三四行今
日再行故知大便不久出今爲小便數少以津液當
還入胃中故知不久必大便也仲景於大便不通不
下之下不治之治如此後人尋思於此而擴充之卽
此篇治法亦自有在矣

小便淋

滑石寒大寒○通九竅六府津液去留結止渴

冬葵子及根寒○主五癰利小便

白茅根寒○利小便下五淋

瞿麥寒○關格諸癰結小便不通

榆皮平○大小便不通利水道

石韋平○五癰閉不通利小便水道

葶藶寒大寒○下膀胱水伏留熱氣

蒲黃平○心腹膀胱熱利小便

麻子平○逐水利小便

琥珀平○通五淋

石蠶寒

○主五癰破石淋解結氣利水道除熱

蜥蜴寒

○主五癰邪結氣破石淋下血利小便水道

胡燕屎平

○破五癰利小便

衣魚溫

○婦人疝瘕小便不利又療淋

亂髮微溫○五癰關格不通利小便水道

蜀本林石暖○主石淋水磨服之當得碎石隨溺出

藥對車前子寒主淋○主氣癰止痛利水道小便

茯苓平主淋利小便君

黃芩大寒主利小便臣○逐水利小腸

澤蔞寒主淋利三焦停水君○消渴淋瀝逐膀胱三

焦停水

敗鼓皮平主利小便臣

冬瓜微寒主淋小便不通君○利小便止渴

桑螵蛸平主五淋利小便臣○通五淋利小便水道

證類豬苓平○利水道

石鷲寒○以水煮汁飲之治淋有效

海蛤平○治水氣浮腫下小便藥性論

木通平○通利九竅

貝齒平○主五癰利水道

說者謂靈蘭秘典論言膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣故利小便者在用溫通以化膀胱之氣而巢氏則謂腎虛膀胱熱乃爲淋兩說正相歧也

夫巢氏固云水入小腸下於胞行於陰爲洩便腎氣通於陰陰爲津液下流之道若腑藏不和則腎虛而膀胱熱熱則津液洩便遂數且澀淋瀝不宣故謂之爲淋矣而泰西家則言腎之情熱與溼膀胱之情冷與燥且言腰體之內有一穴以膜皮圍用爲吸取血液絡脈絡鄉縛絡使溺液流通乃以腰之驅德進於溺液之吸德下至膀胱而瀉焉則出雖由於膀胱而化氣則繫於腎腎之熱溼正所以和膀胱之冷燥且腎曰驅膀胱曰吸則是一藏一府緊相接遞相和者也若驅德不濟吸德遂優於是熱與溼者移於膀胱而道路不順津液內溢故小便如粟狀小腹弦急痛引

臍中以是篇中溫劑竟少而性寒者類以清膀胱之熱平者類以助腎之驅斯亦知彼說雖異而無不可通矣然謂淋家不可發汗發汗必便血何也請卽篇中所列衣魚亂髮論之夫血水同源竝藉心火蒸化其精者行於陰分爲血粗者行於陽分爲溺汗亦心之所布而徵之腎者也故曰腎主五液入心爲汗今心以強迫之劑必欲作汗而徵諸腎腎方困於膀胱之吸而不能驅其何能更輸將不爽於是心暴斂於下膀胱不勝誅求致所聚之熱所蓄之溺竝蒸迫化血下行矣亂髮之用能使水火合德而化氣故血源濬而水自通水道利而血自止衣魚之用能化水

溼於木氣閉塞中使從竅穴而達故去疝瘕卽以通水道利水道卽以消疝瘕淋家緣發汗而溺血惟以是耳

自其疲罷而言謂之癰自其艱阻而言謂之淋癰罷

病也

說文

淋懔也小便難懔懔然也

釋名

癰之虛者溺多

汗多泣多唾多氣出而不反其實者溺秘汗秘目乾

舌乾氣結而不解此其所以然旣見於疏證石韋下

矣而病源復列五淋之目曰熱曰冷曰氣曰沙曰勞

病則似不相兼治則多容相濟者蓋癰之虛近於淋

之勞與熱淋之沙與冷又近於癰之實且兩端皆有

因氣成病者則本篇之竝列五癰五淋非疊出亦非

混淆矣况言治癰之下不言治淋言治淋之下不言

治癰耶惟曰利小便曰利水道曰利小便水道曰逐

曰下則不得不縷析而鬯其義焉夫小便者水道之

委水道者小便之源宜利小便者必源清而委不順

宜利水道者必委道而源不繼利小便水道則通徹

源委之謂也又何難竟其義哉下降

平聲也史記陳涉世家

索謂降之也

史記酈食其傳

逐從也

楚詞河伯乘白龍兮逐文魚注

馳逐也

文選南都賦羣土放逐注

流蕩也

荀子儒效篇故風之所以不逐者注

以是

論之下者因其不順脅之使順也逐者因其無力助

之推送也然則曰通曰利又何以別之夫通者對不

通而言利者能通而不能便利如指也是以篇中凡

言下言通者其物多有力而迅言利言逐者其物多宛轉而和以此權衡藥之緩急卽以此科度病之虛實則爲癰爲淋之差別自明而三焦膀胱之通塞順逆自見矣

素問六節藏象論靈樞終始篇禁服篇咸謂人迎脈大四倍曰格寸口脈大四倍曰關關爲溢陰格爲溢陽人迎氣口脈竝大四倍曰關格關格之脈羸不能極於天地之精則死皆言脈而不言證難經三難曰關以前者陽之動遂上魚爲溢爲外關內格此陰乘之脈也關以後者陰之動遂入尺爲覆爲內關外格此陽乘之脈也三十七難曰邪在六府則陽脈不和

陽脈不和則氣留之氣留之則陽脈盛矣邪在五藏則陰脈不和陰脈不和則血留之血留之則陰脈盛矣陰氣太盛則陽氣不得相營故曰格陽氣太盛則陰氣不得相營故曰關關格者不能盡其命而死此則明其理而猶未言其證仲景曰寸口脈浮而大浮爲虛大爲實在尺爲關在寸爲格關則不得小便格則吐逆跌陽脈伏而濇伏則吐逆水穀不化濇則食不得入名曰關格則言其證矣而與本篇所治尙未盡符巢元方曰關格者大小便不通也大便秘不通謂之內關小便不通謂之外格二便俱不通爲關格由於陰陽氣不和榮衛不通故關格則陰陽氣痞結腹

內脹滿氣不行於大小腸則大小便不通又風邪在三焦三焦約則小腸痛內閉大小便不通日不得前後外臺秘要曰集驗云關格之病腸中轉痛不得大小便葛氏云卒關格大小便不通支滿欲死二三日則殺人姚氏云風寒冷氣入腸忽痛堅急如吹狀大小便不通或小腸有氣結如升大脹起名爲關格則詳於證且與本篇之治合矣卻又不及乎脈紛紛諸說遂可聯脈證爲一貫耶自其淺而言則脈較大四倍爲何如狀不能極天地之精爲何如候豈得以大小便不通一節概之殊不知由大小便不通而脹滿由脹滿而大小便益不通上不得入下不得出又安

能呼吸天地精氣以爲生卽葛氏亦謂二三日則殺人又何能更盡其期以死若是猶以爲輕渺必立幾之證乃得爲甚耶雖然此非篇中瞿麥亂髮所治之關格也欲求瞿麥亂髮所治之關格則仲景所論其庶乎蓋寸口之脈浮爲氣虛大爲陽實在上則陽越而氣無以攝在下則氣餒而陽無以洩所謂陽實而不能化氣者也故曰在尺爲關在寸爲格關則不得小便格則吐逆觀乾薑黃連黃芩人蔞之治格卽可以悟治關之法矣而不曰不大便自固與脈偏大四倍已上者異也跗陽之脈伏爲陽鬱濇爲絡虛陽鬱而欲達不得達則吐絡虛而陽不爲之行則腕中乾

而食不得入曰此爲關格則并不重在小便之不利而重在吐逆矣絡虛而氣不行陽實而氣不化其病皆涉於火瞿麥開火之府氣者也亂髮化火之藏氣者也藏氣化則血源濬而水自通火府開則水氣清而火自散故凡兩物之用固在脈之偏大偏小而實不得以四倍已上爲準其效固在通小便又實不得以大小便並不通爲準且二物於關格之下竝繼以不通字樣則凡篇中別物下言其病曰不通言其效曰通者皆可以關格類推矣

小便利

牡蠣平微寒○澀大小腸止大小便

龍骨平微寒。縮小便。

鹿茸溫微溫。主小便利。

桑螵蛸平。夢寐失精遺溺。

漏蘆寒大寒。止遺溺。

土瓜根寒。止小便數不禁。

雞胫微寒。主小便利遺溺除熱止煩。

雞腸草微寒。止小便利。

藥對 菖蒲溫止小便君。止小便利。

菟醬溫主尿不節臣。

證類 山茱萸平。通九竅止小便利。

小便利實該小便多小便不禁小便數遺尿四證而

四證者惟小便數爲有熱餘則皆屬陽衰陽衰之中
又宜分作兩端如孩提之善遺尿是陽氣之未充也
老人之苦溺多至夜尤甚是陽之已竭也大抵小便
者根於腎行於膀胱膀胱者以氣爲用氣盛則中熱
而有紀律經行者不敢不受其節制氣弱則中寒而
不能自振經行者遂不受約束直達而過焉是故小
便數者約束太過也小便利者逕情直行也小便不
禁者醒而不能約束也遺尿者昏而不能約束也昏
而不能約束猶可俟醒醒而不能約束則直陽之憊
矣然此皆常病可於方書覈證檢方以求愈者也此
篇所載則更有啓發元悟醒惕靈機者在焉篇中大

旨小便之行固恃夫陰陽之相化尤喫緊在土之滲
滲蓋惟其滲是以精華必畱惟其滲是以形質必去
惟其當滲是以有藉夫陽惟其當滲是以有藉夫陰
陰者所以召陽使歸而行所當行止所當止陽者所
以布陰使溉而內沾五藏外透皮毛且客熱恃陰以
消孤陰恃陽以化相裒相益以底平成此不更於病
源千金外臺前加一曳綱振領乎況以水中多節之
物制水之無節便而不溺之物轉溺而不便之爲病
引而伸之觸類而長之醫中關鍵不益明瞭哉雖然
小便利之候不得兼渴也若兼渴則是消渴病而非
小便利矣

漏盧夫人知其能利水此則曰止遺溺小便利者其
患必在竅之通此則曰山茱萸能通九竅止小便利
又通五淋利小便水道者必與遺溺相違惟桑螵蛸
兩者兼治是焉知其能不適相反耶是三者皆當詳
其兼證按其氣化而明之夫漏盧春夏色白屆秋變
黑能化金爲水固治溼熱之物也乃主皮膚熱而有
惡瘡疽痔溼痹是外之熱不能入內以逐其溼內之
溼不能及外以和其熱矣膀胱者腎之表而肌膚又
膀胱之表倘其病表裏不相符而水道不利者是腎
虛膀胱熱用此正以除表熱而逐裏溼遺溺者是膀
胱虛冷不能約水用此正以挽外熱歸裏而約水山

茱萸花於仲春實於初夏必屆冬乃成味酸性平是能挽金水以涵木回下降以爲升之物也乃主心下邪氣寒熱逐寒溼痹是取其收中有發發中有收矣而更治頭風風氣去來鼻塞目黃耳聾面皤而遺溺是其一竅過通而諸竅皆閉通其諸竅卽所以治一竅之過通桑螵蛸深秋生子仲夏成形是隨陰之斂謐而藏隨陽之昌熾而出矣本經以通五淋利小便水道列於傷中疝瘕陰痿血閉之下是欲其化陰之斂謐而從陽以出別錄以止失精遺溺列於男子虛損五藏氣微之下是欲其化陽之昌熾而從陰以藏三者雖同工而異調而中實有理焉如此

溺血

戎鹽寒。心腹痛溺血

蒲黃平。利小便止血消瘀血

龍骨平微寒。主溺血

鹿茸溫微溫。主溺血

乾地黄寒。主溺血利大小腸

蜀本葱涕平。主溺血

證類牛膝平。逐惡血留結。藥性論

車前子寒。葉主血瘕下血小便赤止煩下氣

柏子并葉平溫

世之引經義言溺血者莫不以氣厥論胞移熱於膀

肱爲據特旣曰癰溺血則屬血淋非但溺血也血淋必溺瀦溺血必溺自如巢氏曰心主血血之行身通徧經絡循環府藏勞甚則散失其常經溢滲入胞而成血淋是熱淋之甚者推其源雖溺血之所由原不外是別其類實通塞之殊致矣然則痿論所謂悲哀太過則胞絡絕胞絡絕則陽氣內動發則心下崩數洩血者可爲經義之準歟是固衄痿之源卻亦溺血之鵠矣然因勞悴而生火與因七情而動陽其所從來縱有久暫之殊而以陽搏陰實無彼此况胞衄者屬心而絡於胞中證旣不能離胞情又不能離熱遂謂其竟相懸絕可乎夫解結釋縛必摘其綱別嫌明

微須窮其目事固有本協黍銖末殊尋丈者此血淋
溺血證必不可不別而治原無不可相同况溺血已
久續以急瀉急瀉先愈旋復溺血者甚多耶在此篇
之理固不必以此而費辭但欲明病之所由然則終
不得不詳乎此耳蓋血與水本同源而有凝釋之殊
其不歸經絡而自甘與水爲伍隨其流行坎止者不
特化源有愆常度必擁衛之土氣受盛之木氣均有
不循其職焉何但陰陽薄蝕水火迫蕩已哉是故從
水以凝之從土以浥之從陰以除其熱迫從陽以填
其漏卮而土浥之中復分從火中使之收攝從水中
使之和諧兩塗其所以如此者緣靈素於此旣言之

未詳後世復無有推明之者千金外臺雖列多方然亦不述其源惟孫氏於第一方提明房勞傷中尿血夫房勞而致傷中必亦祇係胞脈之不咸彼之悲哀動中者能使胞脈閉而月事不來則此之胞脈閉而血常自下者自必因恣樂之過極不參覈至是恐不特不能了此篇之旨卽千金外臺諸方亦未能取之左右逢源矣溺血云乎哉

本經序疏要卷二

本經序疏要卷之三目錄

消渴二十二

黃疸二十三

上氣欬嗽二十四

嘔吐二十五

痰飲二十六

宿食二十七

腹脹滿二十八

心腹冷痛二十九

腸鳴三十

[illegible]

本經序疏要卷之三

武進鄒澍學

消渴

白石英微溫。主消渴陰痿不足。

石膏微寒大寒。止消渴煩逆口乾舌焦不能息。

茯神平。風眩風虛五勞口乾。

麥蘗冬平大寒。虛勞客熱口乾燥渴。

黃連寒微寒。止消渴。

知母寒主消渴熱中除邪氣。

栝樓根寒主消渴身熱唇乾口燥短氣。

茅根寒。止渴。

枸杞根大寒。熱中消渴。

小麥微寒。止躁渴咽乾利小便。

箢竹葉大寒。根作湯益氣止渴補虛下氣。

土瓜根寒。主消渴內癰。

葛根平。主消渴身大熱起陰氣。

李根大寒。主消渴止心煩逆奔氣。

蘆根寒。主消渴客熱止小便利。

菰根大寒。主腸胃痼熱消渴止小便利。

冬瓜微寒。止渴。

馬乳冷。止渴。

牛乳微寒。補虛羸止渴。

羊乳溫。潤心肺止消渴。

藥性論

桑根白皮寒。熱渴水腫。

藥對茯苓平主口乾君

理石寒主口乾消熱毒君。解煩毒止消渴。

兔絲子平主口乾消渴。口苦燥渴。

牛膽大寒主渴利中焦熱君。口焦燥。

苧汁寒止渴使。漬苧汁療渴。

古屋瓦苔寒主消渴。

兔骨平治熱中消渴臣。

豬苓平主渴利使。

或謂石藥肥甘酒鹽四者皆致消渴隋唐已來巢氏

治致水所難制之火則未及也况釋名云消渴係腎氣不周於胃中腎氣不周於胃中豈特火之所爲耶予謂四十九難曰腎主五液以布五藏在肝爲泣在心爲汗在脾爲涎在肺爲涕自在爲唾則胃中津潤所以漑喉舌而滋呼吸者獨非腎之所布乎寶命全形論曰鹽之味鹹者以其氣令器津洩夫鹽得水可化得火復成此其令消渴在乎合水則行而不留遇火則結而不散矣營衛生會篇曰酒者熟穀之液其氣悍以清故能後穀而入先穀而液出此其令消渴在乎氣係於上而不去質傾於下而不停矣何況石

藥者入水不濡入火則赤肥甘者遇水便浮著火能
燃此其蟠踞於人身但應火而不應水且使藏府不
浥不沾又何論夫周是其涸竭之患豈但胷中蓋將
徧有焚如之害固非特火之所爲也諸家之論雖詳
大率巢氏之消渴渴利內消三者最爲明爽曰消渴
者渴而小便不多也渴利者隨飲卽洩也內消者不
渴而小便多也今以是篇覈之渴飲而小便不多非
有所洩卽有所停寒而燥者以治洩於下寒而達者
以治洩於外散而清者以治停於上寬而利者以治
停於下者也隨飲卽洩者非四旁不沾卽直道無節
故凡通內痺行脈絡皆以使其沾厚土氣助薰蒸皆

以使其節至不渴而小便過利自有小便利篇可按然篇中往往列止小便利之物不在小便利篇者豈不可彼此參伍求所以分所以合耶若夫不渴不利善食易消古人謂之食亦與消渴無涉也

素問氣厥論心移熱於肺肺消心移熱於肺鬲消熱能爲消是固然矣寒亦可爲消乎此可證之金匱要畧者也假使寒不能消何得治之以八味腎氣丸耶曰寸口脈浮而遲浮卽爲虛遲卽爲勞虛則衛氣不足勞則營氣竭由是觀之非寒則脈何以遲夫心本不任受寒心所謂寒蓋在所主之血脈中其移肺亦由榮泛及衛耳且非外中之寒亦非卒受之寒乃陽

氣之不營於外而直升直降於內者也營衛既失其樞資稟遂不合度故內而陽氣熾盛常藉水以自救外而營衛無所汲引則其水直漚而下且曳一身津液并而泄焉故曰肺消者飲一溲二死不治此卽前所謂不沾者其於病源實兼渴利內消者也曰趺陽脈浮而數浮卽爲氣數則消穀而大堅氣盛則溲數溲數則堅由是觀之數熱徵也夫鬲以隔蔽清濁而非匿寒藏熱之所心肺以熱相移清道陽氣熾盛遂不變化取汁爲赤以分布灑陳而一歸於三焦膀胱焉故曰堅數相搏卽爲消渴此卽前所謂不畱其於病源則所謂渴利者也統而計之陽宗於心陰根於

腎心所以移寒移熱皆由腎陰不上交於陽而肺遂失其節宜裒益以底於平是則責之所攸歸耳八味

腎氣凡攝土中水氣以濬陰之源

地黃拔土氣最力薯蕷入土中最深

而喜攀磚附石山茱萸於季春結實至初冬乃成亦吸土氣以濟水者

動水中火氣以

振陽之本

附子桂枝

而使天一之水由下以及上

澤瀉

由上

以歸下

茯苓

浮游之火鬱結之血藉此遂周流而不滯

焉

牡丹

得非能降火升水使兩相濟而稱物平施者耶

有是以通本篇之不逮卽由本篇以通仲景之所及如治消渴之用五苓散豬苓湯白虎加人蔘湯白頭翁湯其中石膏知母黃連豬苓茯苓固皆列於是矣肺消鬲消獨不可由彼而更求於此篇哉

然則食亦可以是篇之義通之乎此則不可郊特牲曰食養陰飲養陽藏陰也府陽也氣厥篇論消渴之源在五藏食亦之源在六府五藏之不咸則無以制通而病反在陽故本篇之藥多主氣而輕清六府之不調則無以制藏而病反在陰故聖濟總錄食亦諸方多主味而沉著惟其流異是以不可通非特此也凡因消渴而致之水氣治法遂絕不同惟其源同是以可通凡不與消渴類之強中治法乃殊不異卽此可明其指矣

黃疸

茵陳蒿平微寒○風溼寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃

小便不利

梔子寒大寒○通小便解五種黃病

藥性論

紫草寒○主心腹邪氣五疸

白鮮皮寒○主黃疸

生鼠微溫

大黃寒大寒

豬屎寒○主寒熱黃疸溼痹

瓜蒂寒○療黃疸

栝樓寒○除腸胃中痼熱八疸身面黃

秦艽平○差五種黃病

唐本黃芩大寒○主諸熱黃疸

證類
牡鼠微寒

小茈胡湯小半夏湯小建中湯瓜蒂散五苓散桂枝
加黃芪湯豬膏髮煎皆治他證爲本黃疸爲標他證
愈黃自不能不愈也大黃消石湯梔子大黃湯消石
礬石散梔子槩皮湯麻黃連軹赤小豆湯則黃疸爲
本矣而標病猶盛不能竟捨標從本故宜有輔佐以
擊動其標其本乃能釋也惟茵陳蒿湯乃爲黃疸正
劑知茵陳蒿湯爲黃疸正劑則身黃如橘子色小便
不利腹微滿爲黃疸主候發熱不惡寒但頭汗出餘
無汗齊頸而還渴飲水漿小便不利爲黃疸正因矣
發熱不惡寒反惡熱是爲陽明病而承氣證爲陽明

病之正出茵陳蒿證則陽明病之對出以一有汗一無汗一小便過利一小便不利汗出多小便利所以成乎燥汗不出小便不利則本燥末溼所以祇對化耳不然凡脈遲食難用飽飽則微煩頭眩小便難縱下之腹滿如故必其中先硬後溼非特不能全成燥證且駸駸乎將全成溼證者何以亦用茵陳蒿湯耶此全從傷寒外邪立論者若更參以金匱雜證則不必有外邪但係本燥末溼者均得成黃故夫酒者氣燥而質溼受其傷則心中懊懣而熱不能食時欲吐遂爲酒疸房勞甚者陰已泄陽不得越遂與已化未成之陰精糾結怫鬱於中欲出不得雖微汗出小便

自利而不免薄暮手足中熱膀胱急而爲女勞疸更益之黃汗所謂五疸具矣篇中義旨亦明明推茵陳蒿湯爲督率覈以傷寒金匱所隸治黃諸方無非由此而因候加味合成成方如因懊懣則合入梔子豉小承氣而爲梔子大黃湯因小便不利則合入五苓而爲茵陳五苓散因表利裏實則合入調胃承氣而爲大黃消石湯是也獨調胃承氣湯用水消此用火消更覈消石礬石散亦用火消似其中必有故者蓋火消是曳陰向陽乃攜溼以就燥而散水消是化陰濟陽乃剖燥以凝溼而行於此卽可以悟陽明病之正出對出矣

至於篇中白蘚秦艽栝樓根黃芩仲景雖未嘗用治黃而葛氏肘後孫氏千金王氏外臺諸方多用之揣其意旨亦非貿貿然徒用之而已也蓋於此有以窺黃證之微焉夫黃根於溼熱客於脾胃固不待言矣然非必上罩下承面面周帀密圍也定有一端滲泄處焉惟滲泄不敵其搏聚是以蒸鬱而成耳不然則所謂陽明中風衄弦浮大而短氣腹都滿脅下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後臃刺之小差外不解之候何以見不尿腹滿加噦者遂爲不治耶一端滲泄者何如栝樓根之主小便利是其黃必仍小便

通矣黃芩主諸熱黃疸腸澼泄利是其黃必大便泄
矣白蘚主頭風黃疸是其黃必頭面多汗惡風矣秦
芫主寒溼風痹是其黃必骨節煩疼矣倘不依證尋
治馴致病氣連橫不至水氣脹滿不已故曰疸而渴
者其疸難治疸而不渴者其疸可治蓋疸病至渴則
溼已盡從熱化薰熨元氣元氣不支求助於水駐見
水日增而火日熾如潑膏以救燎愈益其不能息耳
况其病不愈則劇自有定期不容遷延耽緩所謂當
以十八日爲期治之十日以上瘥反劇者爲難治耶
十八日者四季土旺用事日數也土之所任僅能及
此過是以往力遂不勝則將轉移他處而木金水火

皆非藏受溼熱之所無力推傳則土困頓而崩頽矣

曷若及早驗其所向因勢以利導之耶是故頭面汗

多是風舉溼於上則令其沉於下俾其氣徹底而隨

之化焉

白藓根藏穰氣
籜氣者木氣也

骨骭煩疼是風拒溼於外則

令其連於內俾其氣疏通而爲之化焉

秦艽羅紋密
織盡從左旋

是化風歸水自
上下下之治也

小便自利者其病不在溼而在熱則

滋化土中之熱使與溼離而自已

枯樓根澄之則散
而成粉味苦氣寒

能使土中
溼熱離散

大便泄利者其熱有所歸緣溼滯之而不

爽則清化腸中之溼使隨熱泄而病除

黃芩形如腐
腸治因熱生

溼故能清利
腸中溼熱

經方用藥總在定六氣以見病源隨形

色性味以爲治則非後世漫云以寒治熱以利泄溼

籠統不切於病機病情毫無關照者比也

黃汗一證自巢氏隸之黃病門後世遂視爲黃病支流據金匱則證鄰於歷節目列於水氣蓋黃病與黃汗本異而末亦不同黃汗與歷節乃異派而同源也何以言之夫黃病之甚動云有麴塵然未聞有能染衣至黃者黃汗則汗本不黃至沾衣乃如漿汁以黃病屬脾家脾爲土土之生物不倚他助黃汁屬心家心爲火火之燔燎必著他物是其一病於肌肉一病於血脈爲殊絕也至其所由然則與歷節竝因汗出入水中如水傷心故黃汗脈自沉歷節脈沉弱黃汗汗黃歷節亦汗黃黃汗發熱歷節亦發熱第歷節支

節疼或疼痛如掣黃汗則僅重而痠歷節身體羸瘦
獨足腫大黃汗則身體洪腫四支面目皆腫而胃中
窒不能食反聚痛口多涎暮躁不得眠乃歷節所絕
無是同爲水傷心而有甚有不甚甚卽所謂小便通
利上焦有寒者也統三者計之皆爲溼不得泄然惟
黃病爲尤甚黃病分歧於肌肉歷節分歧於骨節固
不待言矣乃黃汗既有汗而小便又利獨爲最有去
路反至化溼成水何也夫水氣亦何嘗不從溼化然
惟火能爲之宣導則無此弊黃汗者因雖從外及內
病實從內外出是火之不宣已明著矣况祇有身黃
之水氣竝無黃汗而身黃水氣而身黃者內本能宣

由外鬱遏不得開故越婢湯中用麻黃黃汗本自有汗且小便利則外本無所阻而內之宣導不力故桂枝加黃芪湯芪芍桂酒湯竝賴有桂枝矣由是言之隸於黃病嫌於末似相同也而殊不同隸於歷節嫌於本相同也而末卻大異何如就證論證隸之水氣之爲愈哉

上氣欬嗽

麻黃溫微溫○止欬逆上氣

杏仁溫○欬逆上氣雷鳴喉痹

白前微溫○胃脅逆氣欬嗽上氣

橘皮溫○主胃中痼熱逆氣下氣止嘔欬

二 綱 目 卷 三
紫苑溫。主欬逆上氣胃中寒熱結氣

桂心大熱。主欬嗽

欬冬花溫。主欬逆上氣善喘喉痹

五味子溫。主益氣欬逆上氣

細辛溫。主欬逆溫中下氣破痰利水道開胃中

蜀椒溫大熱。邪氣欬逆溫中

半夏平。生微寒熟溫。喉咽腫痛欬逆腸鳴

生薑微溫。傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐

桃仁平。止欬逆上氣消心下堅

紫蘇子溫。下氣除寒中

射干平。微溫。欬逆上氣喉痹咽腫不得消息散結氣

芫花溫微溫。欬逆上氣喉鳴喘咽腫短氣

百部根微溫。主欬嗽上氣

乾薑溫大熱。胃滿欬逆上氣溫中

貝母平微溫。欬逆上氣止煩熱渴出汗

皂莢溫。除欬嗽

蜀本蛤蚧平。療欬嗽

縮沙蜜溫。下氣

藥對鍾乳溫主上氣臣。主欬逆上氣

獺肝平主氣嗽使。止久嗽

烏頭大熱主嗽逆上氣使。主欬逆上氣消胃中痰

冷

本經序疏要

卷三

十一

藜蘆微寒主嗽逆使。欬逆洩利

鯉魚平燒末主欬嗽臣。肉主欬嗽上氣黃疸止渴
淡竹葉大寒主嗽逆氣上臣

海蛤平主上氣臣。主欬嗽上氣喘息煩滿

硫黃大熱主氣嗽臣。欬嗽上氣腳弱冷疼無力

上氣者不必欬嗽欬嗽者不盡上氣論欬嗽者何不
但標欬嗽則所謂暴嗽久嗽冷嗽熱嗽呬嗽五藏欬
嗽者咸可隸於其中耶夫諸嗽者欬嗽之支分上氣
欬嗽者肺痿肺癰肺脹支飲風水與欬嗽之竝界也
既云欬嗽則諸嗽原隸於中不因兼標上氣而有礙
已標上氣則肺痿肺癰肺脹支飲風水之稍涉疑似

學者遂不得不細心體究以分析之耳不然金匱要
畧部分諸病最爲嚴密既有肺痿肺癰欬嗽上氣篇
矣乃疊出痰飲欬嗽篇耶然則奈何細心體究分析
之夫風舍於肺其人卽欬是欬嗽主腦也欬唾膿血
衄數虛者爲肺痿數實者爲肺癰上氣喘而躁者爲
肺脹欬逆倚息不得臥者爲支飲頸脈動時時欬目
窠下微腫按其手足上陷而不起者爲風水是欬嗽
之條目也覈篇中列藥三十味試舉治肺痿之甘草
乾薑湯炙甘草湯千金桂枝去芍藥加皂莢湯治肺
癰之桔梗白散葶藶湯治肺脹之越婢加半夏湯小
青龍加石膏湯治支飲之木防己湯小半夏湯十棗

湯小青龍湯桂苓五味甘草湯及諸加味治風水之
越婢湯咸藉本篇之味以成方者卻逾篇中三分之
一卽專主欬嗽上氣縱如皂莢凡射干麻黃湯厚朴
麻黃湯澤漆湯幾全賴此成方者亦不過得篇中之
半則諸證之與欬嗽原經界相連犬牙相錯曾謂可
舍此綱領而徒別其支派耶試再覈之千金如百部
根湯之治嗽不得臥兩眼突出蜀椒圓之治上氣欬
嗽杏仁飲子之治暴熱嗽橘皮蘇子煎之治上氣欬嗽
欬冬圓又方之治三十年上氣欬嗽唾膿喘息不得
臥鍾乳則欬嗽之支流竟矣更參之外臺如深師麻
黃湯之治卒嗽延年貝母煎之主暴熱欬深師乾薑

湯之療冷逆欬深師立愈凡欬冬花凡古今錄驗麻
黃湯之治久欬則欬嗽之派別明矣更參之聖濟如
紫菀凡之治肺欬丹沙半夏凡之治心欬木乳散之
治肝欬半夏陳皮湯之治脾欬四味散之治腎欬鹿
角膠湯之治大腸欬人蔘散之治膀胱欬檳榔凡皂
莢凡之治三焦欬亦莫不有篇中之物錯雜其間則
欬嗽之所從駐又瞭然矣不應合而合之足以見病
源之不異應合而不別足以見病變之非歧明乎此
篇則欬嗽之主治已彰參乎經方斯欬嗽之分殊有
在而後欬嗽之爲欬嗽遂無遁情也

然則欬論之義遂可置之勿講歟是又烏可夫肺痿

肺癰支飲卽欬論所謂多涕唾也肺脹風水卽欬論所謂面浮腫氣逆也斯二者皆聚於胃關於肺而本於五藏之邪以傳六府其該甚博其變甚煩不僅肺痿肺癰肺脹支飲風水已也就其初傷在氣久乃涉血筋骸之牽引身體之疼痛甚者爲嘔逆吐衄爲遺矢遺溺是其再變而爲膈噎胃反爲下利洞泄爲霍亂轉筋不難矣特他病則自陽入陰而此獨以藏傳府所宜體究焉蓋論中所謂藏病皆經病府病則入內矣所以然者論中固言之曰皮毛者肺之合皮毛先受邪氣邪氣隨從其合此病從外受者也其寒飲食入胃從肺腧上至於肺則肺寒肺寒則外內合邪

此病從內受者也兩皆歸并於肺故爲肺欬非特此耳其心值夏脾值長夏腎值冬肝值春受邪而肺家適有內受之寒如向所云者當其邪乘經絡以朝肺因之外內合邪亦能爲欬則心欬脾欬腎欬肝欬作矣故病必關肺病因不必關肺病因必由寒病不盡寒不然欬之淺者惟肺與心宜乎病入未深變化未定寒氣應仍在者而胡爲乎反見唾血及咽腫喉痹諸不盡屬寒之證耶至藏欬不已反移於府者以藏主藏而不瀉其守堅府主瀉而不藏其罅疏病在經絡久而不愈勢必內入內入之始未有不從疏而從堅者故久欬不已至移於三焦則腹滿不欲食飲遂

將移於藏矣不然欬久而成勞瘵者亦豈在經在府之病哉此篇雖無治藏府諸欬明文然有可以意會而得其旨者如降氣者皆治上之劑也守中者皆治中之劑也攝氣者皆治下之劑也散結者皆治心肺之物也聚斂者皆治肝腎之物也通利者皆治小腸膀胱之物也醒豁者皆治胃與大腸之物也卽是以推能謂其與經旨絕不相涉耶

嘔吐

厚朴溫大溫。胃中嘔不止

橘皮溫。下氣止嘔欬

人藿微寒微溫

半夏平。生微寒。熟溫。○時氣嘔逆。

麥冬平。微寒。○止嘔吐。

白芷溫。○療風邪久渴吐嘔兩脅滿。

生薑微溫。○止嘔吐。

鉛丹微寒。○主吐逆反胃。

雞子微寒。○鍊之。主嘔逆。藥性論

薤白溫。

甘竹葉大寒。○除嘔吐。

旋覆花溫。○開胃止嘔逆不下食。藥性論

白豆蔻大溫。○主積冷氣止吐逆反胃。

藥對附子大熱。主嘔逆使。

竹筴微寒主乾嘔臣

同爲水穀逆出也吐可植躬嘔須曲脊

釋名嘔偃也將有所吐脊

曲偃也

吐猶器滿而溢毋庸勉強嘔已沸騰於中出反

不易故吐如棄物可隨手拋擲

一切經音義引倉頡篇吐棄也

嘔遭

迫脅必聲揚物先

山海經東山經膏水其中多薄魚其音如嘔注如嘔如人嘔吐聲也

則吐爲陰嘔爲陽吐有寒嘔有熱吐屬虛嘔屬實矣

然吐非無實熱證但係有因決非自作

如服桂枝湯而吐其後必

吐膿血等證

嘔亦有虛寒證則能自致不關誤治矣

如嘔而嘔

弱嘔而胃滿等證

故曰病人嘔數不消穀引食而反吐者胃

中虛冷故也嘔數且然何況不數曰傷寒發熱嘔不

能食而反汗出濺濺然者是轉屬陽明也有汗如此

何況無汗蓋陽之出多奮迅其所以奮迅則以陰格

之也陰之出多慘慄其所以慘慄則以陽先潰也故

凡嘔而利者無一虛證十棗湯證大既吐且下者無

一實證四逆湯證吳餘如傷寒三陽證則多嘔而少

吐胃反證則言吐而不言嘔循是以尋其緒餘本篇

所載之物不堪然可明哉特篇中藥物寥寥且大段

治嘔似於兩證偏有側重殊不知嘔吐原有並見者

如黃連湯證小半夏加茯苓湯證小半夏湯證豬苓

散證大半夏湯證是也今篇中兩證並提者本有四

味提吐不及嘔者亦有兩味全篇僅臚藥一十五味

則其多寡之間雖似有所偏重然於本書中覈以霍

亂篇治吐下之物於本書外參以治胃反之物則較於嘔翻有若稍贏者惟篇中偏以大溫之附子主嘔逆則其理所當究耳夫此乃在下陰霾陵逼中陽而中陽宛輓震蕩之候也是其證在仲景書曰嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯主之曰腹中寒氣雷鳴切痛胃脅逆滿嘔吐者附子粳米湯主之此與既吐且利之候正同第彼既下有漏泄則中陽敗散祇能滂沱四瀆是證下無漏泄則中陽但上下猶能沖激作聲用附子者正以散其上逼之陰霾回其離窟之生陽也然四逆湯證與附子粳米湯證又復不同一則在下亦有聲是陽猶能與陰爲

梗故須佐以調和爲一成不敗之計一則小便復利是陰陽不相堵禦故更助以溫守而陽之回不回陰之定不定尙在不可知之天曰難治者以此而其用附子之意則一耳由是言之應用附子之嘔是嘔之敗局用附子治嘔是治之急著遇非常之證自不得以常法禦之固難與凡嘔凡治並論者也

嘔吐噦自金匱要畧已下皆連綴一處惟茲則剖隸兩篇曰嘔哕曰嘔吐不知者必以爲妄分畛域孰知均胃病也而有脾不濟胃胃不從脾之別焉巢氏曰新穀未及傳化故穀之氣與相干犯胃氣則逆胃逆則脾脹氣逆遇冷折之則噦風邪在胃則嘔膈間有

停飲胃內有久寒則嘔而吐是噦由氣嘔吐由質氣者應恃脾之磨而消質者應恃胃之輸而化氣不消是脾不濟胃也質不化是胃不從脾也不然何以噦僅有聲而嘔吐兼有物耶試以兩篇所列之藥較之相同者五厚朴橘皮人蔞附子竹茹嘔哕餘十五味而九物之用

在氣

香薷雞舌香小蒜高良薑桂藟肉豆蔻丁香朮皆用其氣

嘔吐餘十味而七

物之用

在半夏麥冬生薑鉛丹雞子甘竹葉旋覆花等皆用其味

若然則合

之者以其相類分之者以其相差循軌以導其行溯流以求其本務欲後人識顛末知嚮方則一也

乾嘔與停飲而吐恰相反對蓋乾嘔有火卻係虛火停飲有水全非實水故服白通湯後厥逆無脈乾嘔

煩者白通加豬膽汁人尿湯通脈四逆湯證乾嘔者
加生薑乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯乾嘔吐逆吐
涎沫半夏乾薑散乾嘔噦手足厥者橘皮湯中風發
六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐者
五苓散欬而嘔渴心煩不得眠者豬苓湯胃反吐而
渴欲飲水者茯苓澤瀉湯吐後渴欲得水者文蛤湯
卒嘔吐心下痞膈間有水氣悸眩者小半夏加茯苓
湯嘔吐穀不得下者小半夏湯嘔吐病在膈上後思
水者豬苓散胃反嘔吐者大半夏湯夫火不能卻陰
而反被陰迫逐氣不能化水而反任水停滯是陰陽
之悖亂水火之相射矣則不得以治嘔常法治之故

破其陰卽以助其陽降其火卽以和其陰化其水卽以調其氣降其氣卽以逐其水迴與篇中之義不相符矣雖然篇中亦何嘗不計及此凡橘皮生薑附子者果何爲而列哉卽水氣一面篇中亦未嘗不思行水下氣第吐本因水自不應濫列多品占水飲地步故將旋覆花半夏二味微逗端倪使人觸類引伸推尋有法庶無越畔之嫌仍得兼濟之益耳識得虛者爲真實者是僞則嘔吐之爲嘔吐全局大抵屬虛間有大黃甘草湯十棗湯大茈胡湯數證自是絕無僅有故曰傷寒嘔多雖有陽明證不可攻吁可畏哉

痰飲

天黃寒大寒○除痰實腸間結熱心腹脹滿

甘遂寒大寒○主畱飲宿食

芒消大寒○腹中痰實結搏

茯苓平○膈中痰水

芫胡平微寒○除諸痰熱結實

芫花溫微溫○消胃中痰水喜唾

前胡微寒○療痰滿胃脅中痞

朮溫○消痰水

細辛溫○溫中下氣破痰

旋覆花溫○消胃上痰結吐如膠漆心脅痰水

厚朴溫大溫○消痰下氣

人蘆微寒微溫

枳實寒微寒○主胃脅痰癖

橘皮溫

半夏平生微寒熟溫○消心腹脅膈痰熱滿結

生薑微溫

甘竹葉大寒

蕤花寒微寒○療痰飲欬嗽

蜀本威靈仙溫○主心膈痰水

藥對射干微溫主胃中結氣使

烏頭大熱主心下寒冷不下食使

吳茱萸大熱主痰熱腹內諸冷臣

朴消大寒主痰滿停結君

巴豆溫主痰飲畱結利水穀破腸中冷。破畱飲痰癖

證類高良薑大溫

尤潛溪曰穀入而胃不能散其精則凝爲痰水入而脾不能輸其氣則蓄爲飲蓋惟其以穀化故質稠惟其以水化故質稀質稠故能藏寒匿熱而至當用烏頭吳茱萸高良薑薤花甘竹葉能蘊實釀虛而至當用大黃芒消朴消巴豆厚朴枳實人蘊朮茯苓質稀故能內沉外溢而爲裏堅表腫能徹上徹下而爲眩冒食洩又惟其穀入於陰而以質用故痰每流於隱

僻而注於窪下水入於陽而以氣用故欲能歸於四肢偏於身體此四飲分支惟痰飲可獨當一面而三飲者祇可并之而相對待矣雖然痰與飲相殊稱謂自應有別測其所當別則似飲可稱水痰不得稱水者而曰水走腸間瀝瀝有聲謂之痰飲可乎夫穀非由水調不堪食水非由穀出不成痰是其根本原未始非水以水呼之又何不可特既化入穀中還從穀中化出則其搏引稠黏合爲同類自與未曾經化者殊且既有素盛今瘦句冠於其端益可知爲久病而非暴病夫暴病何嘗不有痰飲第觀篇中所列茈胡前胡細辛生薑威靈仙射干等物又豈久病而成者

所可用耶蓋惟其暴病則水爲火逼而成久病則陰
隨陽溜而成仲景所謂當以溫藥和之者久病之治
也篇中所羅性峻刻而注有痰字者則暴病之治矣
然則篇目雙標痰飲篇中所列備悉搜采本經別錄
主治但稱飲者止一味痰水痰飲竝稱者僅七味但
稱痰者至十味不云水飲及痰者七味則偏重於痰
極矣此又何爲者耶夫飲變見之證極多比連之證
亦極多凡嘔吐欬嗽上氣大腹水腫皆是也痰則僅
在是篇若使與諸證諸治相乘除恐反不及飲之多
矣甯反謂爲少耶

仲景於飲與水分之極嚴呼之甚亂如痰飲篇大半

稱飲爲水是也飲固可呼之爲水耶夫飲本水也特有受約束不受約束之分耳受約束者縱能變化不離畛域不受約束者橫流直衝遇隙卽就故痰飲篇曰水在某水氣篇曰某水明明一指爲注於何藏之水一指爲何藏所發之水矣雖然兩篇之旨猶當更有推明者焉曰水在心心下堅築短氣惡水不欲飲水在肺吐涎沫欲飲水水在脾少氣身重水在肝脅下支滿噎而痛水在腎心下悸曰心水者其身重而少氣不得臥煩而躁其人陰腫肝水者其腹大不能自轉側脅下腹痛時時津液微生小便續通肺水者其身腫小便難時時鴨溇脾水者其腹大四支苦重

津液不生但苦少氣小便難腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺陰下溼如牛鼻上汗其足冷面反瘦合而觀之欲飲不欲飲噫悸少氣病皆係於上陰溼陰腫小便難病皆係於下其諸阻於上者謂之飲阻於下者謂之水歟夫上是水之來源下是水之去路來源雖阻去路猶通於何能不受約束濫及他處若來源通而去路塞則時有所益日有所增水從何往而欲其不衝溢他處依規就範得乎是以治水之物通多而化少治飲之物通少而化多檢覈篇中惟芫花甘遂薤花巴豆朮與大腹水腫篇同用其餘則各有所當矣水聚於上而論其欲飲不欲飲水聚於下而論

其津液生不生似甚難解然不知阻於上者欲其化阻於下者欲其通既化既通則清光來而滓穢去夫固曰津液微生小便續通矣是故篇中所具行經絡解客感皆引清光之物也下畱結滯壅淤皆去滓穢之物也

內經未嘗言及痰飲金匱要畧則詳論之矣然及飲多而及痰少千金外臺則已痰飲參半沿至後世乃飲日少而痰日多何哉此又世道升降之會也蓋維元古飲與食庖治無不精詳飲湯飲水各按其時則入陽而資氣化茶蓼稻黍各佐其肉則入陰而養元精傳曰肉雖多不使勝食氣肉中既有食氣勝之矣

於何能入陰而成痰經曰漿人掌其六飲水漿醴涼
醫醴水中既有冷熱節之矣於何能入陽而成飲中
古制御多失其方是以痰飲竝興然緣烹茶之度甚
精則既能導飲不畱復能運食不滯及夫近世茶惟
點啜則未得其氣之全肉務煎燂則反增其味之厚
於是水入成飲肉入生痰駸駸乎無病不以是棘其
治矣况更熬澹巴菰之葉常吸其煙豈知此實劫飲
化痰之妙劑哉歷攷經方竝無引飲令吐之法有之
自金元四家始子和在前專工劫掠景岳繼述稍務
平和然實爲今日吸煙作俑倘無神聖闡別痰飲界
域於前勢必將遇痰卽逐試觀今人之痰果堪逐否

耶篇中雖未嘗不用逐而妙在解痰之爲窟容邪去痰之連衡痰滯痰隨氣結開氣卽以行痰痰與熱壅化痰卽以清熱釋寒之縛痰脫火之膠痰補其虛而痰自退舍聽命攻其實而痰自隨跡消除化痰之法盡矣學者更能擴充於此而權衡其輕重焉益可不治痰而痰自無不順矣

宿食

大黃寒大寒。破畱飲宿食蕩滌腸胃推陳致新

巴豆溫生溫熟寒。開通閉塞利水穀道

朴消寒大寒。胃中食飲熱結

芫胡平微寒。去腸胃中結氣飲食積聚

朮溫。消食

桔梗微溫。溫中消穀

厚朴溫大溫。宿食不消

藥性論

皂莢溫。療腹脹滿消穀

麴溫。消穀止利

蘗溫

檳榔溫。主消穀逐水除痰

宿食不徒停也蓋必有所挾焉外臺秘要方目所載有傷寒宿食不消方有畱飲宿食方有因食飲水上氣方有食不消成癥積方有積聚宿食寒熱方有食癥及魚肉成癥方有冷利食不消方有下利清穀方

有下利食完出方大率體氣實者食因病而留病據
食爲橐體氣虛者食遺病以洩病因食遂殆所以仲
景書舍攻下溫補無別法獨於差後勞復出一枳實
梔子豉湯而曰有宿食者加大黃遂可見其因病治
病卽於中挾入利導之治不別立間架畛域竟指爲
一病也而今者特建標題爲病綱領何哉推其微義
蓋亦以經方值此大抵用攻第因病而致食留不去
病而食可行乎故首列三品原係經方正治無從遺
漏此外則因邪而結者疏其邪因氣而滯者調其氣
因肥膩而膠黏者卽爲消其脂膏因痰水而勾留者
卽爲行其滯蓄甚至折其生氣而使難消者消發其

生氣而使難化者化如麴與蘖者蓋亦神乎治矣於此見本書特立是篇正爲別樹一義羽翼仲景救後人遇食卽攻之失耳

腹脹滿

麝香溫○中惡心腹暴痛脹急痞滿

甘草平○煩滿短氣

人蔘微寒微溫○胃脘逆滿

朮溫○除心下急滿

乾薑溫大熱○霍亂脹滿

百合平○邪氣腹脹心痛浮腫臃脹痞滿寒熱

厚朴溫大溫○腹痛脹滿

庵闍子微寒微溫。腹中水氣臘脹留熱

枳實寒微寒。消脹滿心下結痞痛逆氣

桑根白皮寒。水腫腹滿臘脹利小便

皂莢溫。療腹脹滿消穀

大豆黃卷平。五藏胃氣結積

唐本
卷柏溫

蜀本
萆澄茄溫。主心腹間氣脹令人能食

藥對
忍冬溫主腹滿君。主寒熱身腫

射干微溫主脅下滿急使。散結氣腹中邪氣

香薷微溫主腹滿水腫臣

旋覆花溫主脅下寒熱下水臣。主結氣脅下滿

證類

訶梨勒。主冷氣心腹脹滿下食

草豆蔻

直湓曰滿橫充曰脹皆氣有所向而不遂也脹與弛

對

左成十年脹陷而卒作張

則知其欲寬緩而不能矣滿與減對

則知其欲降泄而不能矣夫氣之濁者不降則清者不升行者不舒則駐者自急故滿多實而脹多虛在仲景書則脹滿而按之痛者爲實不痛者爲虛脹滿而時能減者爲寒不能減者爲熱厚朴生薑甘草半夏人薑湯大建中湯附子粳米湯虛而寒者之治也大承氣湯大芩胡湯厚朴七物湯厚朴三物湯實而熱者之治也本篇意義大旨似異根柢究同觀其言

痛者寥寥而別著心腹冷痛篇是其注意不全在實氣寒氣平者與氣溫者多半是其設法不全在寒如其用百合庵闔桑皮黃卷忍冬香薷旋覆治邪而非偏寒偏熱之邪用麝香皂莢華澄茄射干訶梨勒草豆蔻行氣而非偏實偏虛之氣獨理中湯全方端然首列則知其病本屬虛而夾輔以枳實之泄滿厚朴之除脹於是唐人之枳實理中厚朴理中都可識經方與是篇恰合之故且行水除痰煥寒清熱備又可見脹滿之因不一而足矣

心腹冷痛

當歸溫大溫○溫中止痛

入瀉微寒微溫。療腸胃中冷心腹鼓痛

芍藥平微寒。疝瘕止痛中惡腹痛

桔梗微溫。胃脅痛如刀刺

乾薑溫大熱。寒冷腹痛

桂心大熱。腹內冷氣痛不可忍

蜀椒溫大熱。除六府寒冷

附子溫大熱。心腹冷痛

吳茱萸溫大熱。去痰冷腹內絞痛

烏頭溫大熱。心腹冷疾臍間痛

芫溫。止嘔逆腹內冷痛

藥性論

甘草平。腹中冷痛

藥性論

礞石大熱生溫熟熱。破積聚痼冷腹痛

蜀本 臘胸臍大熱。心腹痛

肉豆蔻溫。積冷心腹脹痛

零陵香平。心腹痛滿下氣

紅豆蔻溫。心腹攪痛

胡椒大溫。除藏府中風冷

藥對 芎藭溫臣。諸寒冷氣心腹堅痛

黃芩大寒臣。胃中熱小腹絞痛

戎鹽寒臣。心腹痛

厚朴溫臣。腹痛脹滿

葶藶平臣

類證

蒜溫。主霍亂腹中不安

高良薑大溫。霍亂腹痛

蜂子平微寒。心腹痛

蓬莪茂。心腹痛

心腹冷痛次於宿食腹脹滿之下以金匱要畧原屬一篇也第其目增一心字則似連胷痹之痛者亦在其中中間一冷字則似無與於熱然胷痹之治如栝樓薤白白酒湯栝樓薤白半夏湯桂枝生薑枳實湯凡言痛者皆不於此中取材而不言痛之人薑湯反全數在焉若云無與於熱則黃芩固已列篇中又何以爲解矣殊不知治法固有用熱無犯寒用寒無犯

熱者亦有用熱不遠寒用寒不遠熱者別錄載黃芩之治曰胃中熱小腹絞痛則焉知非胃中之熱不下濟反隔礙腸中之寒致無以泄而痛者卽如脅下偏痛發熱脈緊弦明明已指爲寒謂宜溫藥下之附子細辛已隸方中矣其複用大黃何耶惟其有寒故以熱藥爲君惟其寒爲熱激而痛則以寒藥爲臣藥對於黃芩大寒之下原未嘗不注臣字又何不可用之與有以此觀之凡心腹間以冷而痛者其用藥大旨不出此篇之中胃痹不盡屬寒其屬寒者固宜以此篇之藥爲治寒疝則盡屬寒矣故凡大烏頭煎當歸生薑羊肉湯抵當烏頭桂枝湯大半皆藉此成方不

特是也傷寒於理中湯四逆湯吳茱萸湯當歸四逆湯雖不皆言腹痛惟其所用盡取給於此則亦不能決其必無痛矣豈特規規於腹滿寒疝篇之附子梗米湯大建中湯而後謂此方是腹滿痛證哉腹脹滿與心腹冷痛分隸兩篇原不在屬虛屬實上起見前篇已言之第既曰冷則其以屬寒屬熱而分不可泯矣第兩篇同列之藥偏在理中湯及厚朴豈理中厚朴寒熱均可用者耶夫理中厚朴固不可治熱然所謂胃痹心中痞氣氣結在胃胃滿脅下逆搶心者不知果屬寒否如果屬寒則不得云枳實薤白桂枝湯主之人藹湯亦主之矣惟其如是是以此篇載之彼

篇亦載之耳蓋有不痛爲虛痛者爲實之言故但脹滿而不痛者焉能無虛證然雖不痛而有水有痰有寒熱有逆氣其中又何能無實證則剋削之物自多用矣虛者比於寒實者比於熱故旣脹滿而復痛者焉能無實證然雖痛而僅係寒冷所爲則不能不直以溫藥逐之而剋削之物自少用矣此其交互之間正兩證之邊際而大牙相錯者明乎此而後其分其合方有執持也

篇中積藥二十七味註冷者十有三 是標目雖曰冷實與不冷者相參半則其章旨重在痛矣痛之分派八論形象者二曰脹滿痛曰絞痛論所在者四曰心

腹痛曰腹痛曰胃脅痛曰臍間痛更有言痛不言處
言處不言痛二項其大畧可相校也治脹滿痛者三
味言冷者一治絞痛者亦三味言冷者亦一心腹痛
七味言冷者三腹痛七味言冷者五胃脅痛一味不
言冷臍間痛一味言冷言痛不言處四味言冷者二
言處不言痛一味不言冷足見臍間痛無不因寒腹
痛因寒者多不因寒者少但言痛及心腹痛則因寒
不因寒參半脹滿痛絞痛猶間有因寒者惟胃脅痛
則絕不因寒矣所以然者寒託氣於水故就下則不
傍撓歸壑則不上激況篇中凡治寒者勢皆向下惟
芎藭一味兼寓升提則血分之寒固應出就氣分而

解無從與泛治寒者竝論且凡入血之物偏能兼主
疝瘕堅積在篇中可稽也惟本太陽病下之因爾腹
滿時痛者桂枝加芍藥湯主之則芍藥應止滿痛今
乃言痛不言滿霍亂寒多不用水者理中凡主之吐
多者去朮今乃以嘔吐而用朮似與仲景相悖不知
吐多云者原未嘗不利特較之吐爲少也凡兩面奔
馳之證欲其止則俱止作則相稱如一面止一面加
則證益危矣朮本止利今旣利少於吐而更止之是
使爲全吐之敗證矣是以去之非爲有礙於吐也故
下文曰下多者還用朮下多云者見吐雖多而下亦
多勢不偏重也勢不偏重則無須去朮矣况嘔吐而

用朮者甚多奚啻如右然證之以五苓散茯苓澤瀉
湯豬苓散則皆爲有水則今之治痛而嘔吐亦爲水
非爲痛也本太陽病因下轉入太陰部位雖易卻未
易邪自還當以太陽之治治之矣無如桂枝證所受
之邪陽邪也桂枝證所據之地軀幹也以軀幹之邪
而移入腹中爲陽邪陷於陰位陽邪據於陽自宜治
以寒熱停勻之法旣已入陰陰將蔽之而不使出此
腹所以滿陽又不甘爲蔽而與相支持此所以時痛
故必以比於陰而不附陰不助陰者使之入陰以操
同室之戈拔陷入之陽邪仍使從表出耳倘陰不欲
蔽陽僅爲陽入陰中而與陰角則但痛而不滿矣勿

拘拘於滿而不痛不滿而痛此猶脹滿冷痛分爲兩篇之旨也

腸鳴

丹瀉微寒○主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水

桔梗微寒○腹滿腸鳴幽幽

海藻寒○腹中上下鳴

昆布寒

證類半夏生微寒熟溫○胃脹欬逆腸鳴

傷寒汗出解之後胃中不和乾噦食臭脅下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞

硬而滿乾嘔心煩不得安此非結熱但以胃中虛客氣上逆故也甘草瀉心湯主之嘔而腸鳴心下痞者半夏瀉心湯主之腹中寒氣雷鳴切痛胃脅逆滿嘔吐附子粳米湯主之可見水火不相激不爲腸鳴陰陽能相交腸鳴自己然此皆因他病中有腸鳴不得以腸鳴爲病本也惟此數味者所主之腸鳴乃爲病之本然亦同爲陰陽不交水火激射所異者竝無他病乃水爲氣束而難行氣爲痰格而難達淹塞抑鬱莫名其狀而惟腸自鳴耳雖然還宜察其聲以求其故也幽幽者微而和上下者迴而轉欬逆者不欬逆則不鳴此其差等卽有陰不奉陽陽不化陰水不濟

火火不布水之咎而在氣在血在上在下在中之分
誠析其理而投之效矣

本經序疏要卷之三